

31 mai 2014 - Journée mondiale sans tabac**Augmenter les taxes sur le tabac**

L'épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs qui meurent d'avoir respiré la fumée des autres. Si l'on ne fait rien, l'épidémie tuera plus de 8 millions de personnes chaque année d'ici 2030. Plus de 80 % de ces décès évitables seront enregistrés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac 2014, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires appellent les pays à augmenter les taxes sur le tabac.

Réduire la consommation de tabac, sauver des vies

Conformément à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac les pays devraient mettre en œuvre des politiques en matière de prix et de taxes sur les produits du tabac en vue de réduire la consommation de tabac. La recherche montre que des taxes plus élevées sont particulièrement efficaces pour réduire la consommation parmi les groupes à plus faible revenu et empêcher les jeunes de commencer à fumer. Une augmentation de 10 % du prix du tabac suscite une baisse de la consommation de 4 % dans les pays à revenu élevé qui peut aller jusqu'à 8 % dans les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire.

De plus, l'augmentation des impôts indirects sur le tabac est considérée comme la mesure de lutte antitabac la plus rentable. Le *Rapport sur la santé dans le monde, 2010* indique qu'une augmentation de 50% des droits d'accise sur le tabac rapporterait un peu plus de 1,4 milliard de dollars (US \$) de fonds supplémentaires dans 22 pays à faible revenu. Si ces montants étaient alloués à la santé, les dépenses publiques de santé pourraient augmenter dans ces pays d'un pourcentage pouvant aller jusqu'à 50 %.

Buts

Le but ultime de la Journée mondiale sans tabac est de contribuer à protéger les générations actuelles et futures non seulement des conséquences dévastatrices de la consommation de tabac, mais aussi des énormes problèmes sociaux, environnementaux et économiques liés à l'usage du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac.

Les objectifs particuliers de la campagne 2014 sont les suivants :

que les gouvernements portent les taxes sur le tabac à des niveaux qui réduisent la consommation de tabac ;

que les particuliers et les organisations de la société civile encouragent leurs gouvernements à porter les taxes sur le tabac à des niveaux qui réduisent la consommation.

Le 31 mai de chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent partout dans le monde la Journée mondiale sans tabac, mettant en lumière les risques pour la santé associés à l'usage du tabac et préconisant des politiques efficaces pour réduire la consommation.

L'usage du tabac est la principale cause évitable de mortalité dans le monde et est actuellement responsable de la mort de 10% des adultes à l'échelle mondiale.

(Source : Organisation mondiale de la santé)



Présentation de l'enquête ESCAPAD

Depuis 2000, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du Service National, les jeunes Français lors de la Journée Défense et citoyenneté. Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation A la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs consommations de produits psychoactifs. La septième enquête nationale ESCAPAD a été menée du 14 au 22 mars 2011 dans tous les centres métropolitains ainsi que ceux de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion.

Taille de l'échantillon

	Martinique	France entière
Nombre d'individus	440	29 143
Nombre de garçons	222	14 489
Nombre de filles	218	14 654
Age moyen	17,7 ans	17,4 ans

Source : ODICER* - 2011

Statut scolaire (%)

	Martinique	France entière
Elèves, étudiants (17 ans)	91,8	84,7
En apprentissage, formation alterné	2,5	10,5
Non scolarisés	5,7	4,8


Source : ODICER* - 2011

Expérimentation, usage quotidien de tabac chez les jeunes de 17 ans en Martinique et en France hexagonale en 2008 et 2011

	Martinique		France hexagonale	
	2008	2011	2008	2011
Expérimentation du tabac	64,9	48,7	70,7	68,3
Tabagisme quotidien	13,2	13,2	28,9	31,5

Source : ODICER* - 2011

Expérimentation, usage quotidien de tabac selon le sexe chez les jeunes de 17 ans en Martinique et en France hexagonale en 2011



Source : OFDT* -Escapad 2011

*ODICER : Observation des drogues pour l'information sur les comportements en régions

• La consommation de tabac chez les jeunes

D'après ESCAPAD 2011, à 17 ans, 13,2 % des jeunes sont des fumeurs réguliers en Martinique contre 31,5 % dans l'Hexagone. La prévalence du tabagisme quotidien reste stable en Martinique entre 2008 et 2011 tandis qu'elle augmente de plus de 3 points en France hexagonale.

L'enquête ESCAPAD confirme la moins grande consommation de tabac des jeunes de 17 ans en Martinique comparativement à d'autres régions ou à la moyenne nationale. Si pour d'autres produits, il existe des comportements très différents selon le sexe, pour le tabac, les filles consomment presque autant que les garçons.

A 17 ans, moins de la moitié des jeunes déclarent avoir déjà expérimenté le tabac : 48,7 %. L'écart selon le sexe est peu marqué, on constate simplement que l'âge à la première cigarette est un peu plus précoce chez les garçons que chez les filles.

L'usage régulier (au moins 1 cigarette par jour tous les jours) montre plus d'écart entre les sexes en Martinique que dans l'Hexagone.

L'enquête Escapad retrouve aussi une consommation de tabac à 17 ans assez comparable entre la Guadeloupe et la Martinique alors que la situation des jeunes de La Réunion est plus proche de ceux de l'Hexagone.

• **Mortalité liée au tabagisme : un impact peu marqué sur la santé**

La Martinique se caractérise par une nette sous-mortalité pour les pathologies liées au tabac en rapport avec une moins grande fréquence de consommation. En effet, sur la période 2009-2011, les taux standardisés de mortalité montrent que la Martinique est nettement moins touchée que l'Hexagone pour les cancers liés au tabac. Une sous-mortalité est aussi observée en Martinique pour les bronchites chroniques et les cardiopathies ischémiques, pathologies qui sont très liées à une consommation excessive de tabac.

• **Une mortalité prématurée liée au tabagisme moins marquée**

En Martinique, la mortalité prématurée (c'est-à-dire avant 65 ans) liée au tabagisme est moins marquée que dans l'Hexagone.

C'est majoritairement la mortalité prématurée par cancers de la trachée, des bronches et du poumon qui distingue ces deux populations. Pour ce type de pathologies, le taux est plus de quatre fois plus élevé en France hexagonale qu'en Martinique.

Quel que soit le territoire, les taux de mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques et par cancers de la trachée, des bronches et du poumon sont significativement plus élevés chez les hommes que chez les femmes en rapport avec des consommations différenciées selon le sexe.

Taux standardisés de mortalité liée au tabac sur la période 2009-2011 (pour 100 000 habitants)

	Martinique			France hexagonale		
	H	F	T	H	F	T
Cardiopathies ischémiques	34,6	17,3	24,9	78,8	32,6	51,2
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon	25,0	11,8	17,5	80,6	20,5	46,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (dont bronchite chronique)	3,6	1,8	2,5	21,0	6,6	11,9

Source : Inserm CépiDc – exploitation OSM

Taux standardisés de mortalité prématurée liée au tabac sur la période 2009-2011 (pour 100 000 habitants)

	Martinique			France hexagonale		
	H	F	T	H	F	T
Cardiopathies ischémiques	9,3	1,7	5,2	14,8	2,6	8,5
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon	7,0	4,7	5,7	33,9	11,0	22,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (dont bronchite chronique)	0,2	0,0	0,1	2,1	0,7	1,4

Source : Inserm CépiDc – exploitation OSM

Le taux standardisé de mortalité permet de comparer la mortalité dans des populations différentes en éliminant les différences de structure d'âge entre ces populations. C'est le taux de mortalité que l'on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge que la population de référence (ici la population de France entière au recensement de 2006).

• **Lancement du premier baromètre santé DOM 2014 : résultats début 2015**

L'enquête Baromètre santé dans les départements d'outre-mer a débuté en mars 2014. Dans chaque territoire, 2 000 personnes, sélectionnées aléatoirement, seront interrogées par téléphone sur leurs opinions et comportements en matière de santé : consommations de tabac, d'alcool, réalisation de différents dépistages, accès aux soins, etc.

Premiers résultats attendus début 2015.

BON A SAVOIR


Augmenter les taxes sur les produits du tabac

Lorsque les prix du tabac sont en hausse, la consommation est en baisse

Quand l'Afrique du Sud a augmenté ses taxes, on a vu s'effondrer le niveau de consommation du tabac chez les jeunes et les plus démunis. Par contre, les recettes fiscales ont augmenté.

LES TAXES SUR LE TABAC FONT BAISSER LA CONSOMMATION

Rapport entre la consommation de cigarettes et le taux des droits d'accises en Afrique du Sud



Le moyen le plus efficace de diminuer la consommation de tabac et d'inciter les fumeurs à arrêter consiste à augmenter le prix de détail des produits du tabac en majorant les taxes.

Lorsque les prix du tabac augmentent :

- le nombre de consommateurs diminue
- les personnes qui continuent à consommer se restreignent
- celles qui ont arrêté sont moins enclines à recommencer
- les jeunes sont moins enclins à commencer.

Les taxes sur le tabac sont généralement bien acceptées – voire soutenues par bon nombre de consommateurs – car la plupart comprennent la nocivité du produit.

Dans les pays à revenu élevé, on estime qu'une augmentation de 10 % des prix du tabac va réduire la consommation d'environ 4 %. L'incidence de la hausse des prix sur la réduction de la consommation risque d'être supérieure dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Pour en savoir plus :

http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/fr_tfi_mpower_r.pdf?ua=1



L'usage de la cigarette électronique ou e-cigarette, se répand en France comme dans de nombreux pays, mais est l'objet de multiples interrogations.

Il est pourtant nécessaire que les utilisateurs du produit, le public, les professionnels de santé et tous ceux qui assurent la promotion de ce produit reçoivent des messages clairs.

Entre l'interdiction totale décidée dans certains pays et l'absence totale de règles dans d'autres, les experts consultés pour ce rapport, à partir d'une analyse la plus large et la plus objective possible des données disponibles, ont émis des recommandations. [Télécharger le rapport :](#)

http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf

8^e Congrès de la SFT : 6 et 7 novembre 2014



Le rendez-vous annuel des professionnels de la tabacologie. [Inscrivez-vous dès maintenant !](#)

<http://www.csft2014.fr/>

Observatoire de la santé de la Martinique

ISSN : 1146 – 0830



Site Internet : <http://www.ors-martinique.org>